

**Genotypische HIV-1-Resistenzbestimmung**

Die Untersuchung setzt zur Einstellung der Sequenzier-Reaktion eine Bestimmung der HIV-1-Viruslast mittels NAT voraus.

**Material:** 10 ml EDTA-Blut (inklusive Viruslastbestimmung)

Unterschrift und Stempel des Auftraggebers

**Patientendaten:**

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
 Geschlecht: \_\_\_\_\_ CD4-Zellzahl: \_\_\_\_\_ Viruslast: \_\_\_\_\_

**Gewünschte Resistenzbestimmung:**

Protease- und Reverse-Transkriptase-Inhibitoren<sup>1</sup>     CCR5-Antagonisten (gp 120-Gen)<sup>o 2</sup>  
 Integrase-Inhibitoren<sup>3</sup>     Fusionsinhibitoren (gp 41-Gen)<sup>o 3</sup>

**Klinische Einstufung des Patienten:**

therapienaiv     Verdacht auf Therapieversagen     compliant     non-compliant

**Kumulierte Therapiehistorie:**

NRTI	NNRTI	PI	INI	Entry-Inhibitoren
<input type="checkbox"/> AZT	<input type="checkbox"/> EFV	<input type="checkbox"/> APV/FPV	<input type="checkbox"/> DLG	<input type="checkbox"/> T-20 (ENV)
<input type="checkbox"/> DDI	<input type="checkbox"/> DLV	<input type="checkbox"/> IDV	<input type="checkbox"/> EVG	<input type="checkbox"/> MVC
<input type="checkbox"/> D4T	<input type="checkbox"/> NVP	<input type="checkbox"/> NFV	<input type="checkbox"/> RAL	
<input type="checkbox"/> ABC	<input type="checkbox"/> ETV	<input type="checkbox"/> ATV		
<input type="checkbox"/> 3TC	<input type="checkbox"/> RPV	<input type="checkbox"/> DRV		
<input type="checkbox"/> TDF		<input type="checkbox"/> LPV		
<input type="checkbox"/> FTC		<input type="checkbox"/> RTV		
<input type="checkbox"/> DDC		<input type="checkbox"/> SQV		
		<input type="checkbox"/> TPV		

**NRTI:** nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren  
**NNRTI:** nichtnukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren  
**PI:** Protease-Inhibitoren  
**INI:** Integrase-Inhibitoren

**Letzte Therapie vor Resistenztestung:**

NRTI	NNRTI	PI	INI	Entry-Inhibitoren
<input type="checkbox"/> AZT	<input type="checkbox"/> EFV	<input type="checkbox"/> FPV	<input type="checkbox"/> DLG	<input type="checkbox"/> T-20 (ENV)
<input type="checkbox"/> DDI	<input type="checkbox"/> RPV	<input type="checkbox"/> IDV	<input type="checkbox"/> EVG	<input type="checkbox"/> MVC
<input type="checkbox"/> D4T	<input type="checkbox"/> NVP	<input type="checkbox"/> NFV	<input type="checkbox"/> RAL	
<input type="checkbox"/> ABC	<input type="checkbox"/> ETV	<input type="checkbox"/> ATV		
<input type="checkbox"/> 3TC		<input type="checkbox"/> DRV		
<input type="checkbox"/> TDF		<input type="checkbox"/> LPV		
<input type="checkbox"/> FTC		<input type="checkbox"/> RTV		
		<input type="checkbox"/> SQV		
		<input type="checkbox"/> TPV		

**NRTI:** nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren  
**NNRTI:** nichtnukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren  
**PI:** Protease-Inhibitoren  
**INI:** Integrase-Inhibitoren

Stand: 03/2017

<sup>o</sup> Fremdleistung

<sup>1</sup> Leistung gemäß Anlage I der Richtlinie des GBA zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung

<sup>2</sup> Vor Gabe oder bei Verdacht auf Therapieversagen. Höchstens 2x im Krankheitsfall berechnungsfähig.

<sup>3</sup> Unter Gabe bei Verdacht auf Therapieversagen. Höchstens 2x im Krankheitsfall berechnungsfähig.