Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kassen-Nr. | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

Überweisungs-/Abrechnungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung

☐ Kurativ ☐ Präventiv ☐ bei belegärztl. Behandlung

Quartal Q J J

☐ Unfall, Unfallfolgen ☐ Kontrolluntersuchung einer bekannten Infektion

ggf. Kennziffer

Geschlecht W M

Auftragsnummer des Labors

Auftrag (Diagnose/Verdachtsdiagnose und auch wichtige Befunde/Medikation angeben)

Eintrag nur bei Weiterüberweisung!

Betriebsstätten-Nr. des Erstveranlassers

Arzt-Nr. des Erstveranlassers

Vertragsarztstempel / Unterschrift überw. Arzt

Tag	Mon.		Tag	Mon.		Tag	Mon.	

Vertragsarztstempel abrechnender Arzt

Nicht zu verwenden bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Schülerunfällen

Muster 10 (7.2008)

Anforderungsschein für Liquordiagnostik

Entnahmetag: ..... **Entnahmezeit Liquor**..... **Entnahmezeit Serum**.....

Die Abnahme von Serum und Liquor sollte zeitgleich erfolgen.

	Basisuntersuchungen		**Diagnostik degenerativer Erkrankungen**
	Liquor + Serum		**Liquor bzw. Serum**
☐	Zellzahl/Differenzierung	☐	Tauprotein / Phospho-Tau (Liquor)
	Glucose	☐	β-Amyloid (Liquor)
	Gesamteiweiß	☐	S 100 (Liquor)
	Lactat	☐	S 100 (Serum)
		☐	NSE (Liquor)
	Reiber-Schema / Oligoklonales IgG	☐	NSE (Serum)
	Liquor +Serum		
☐	Reiber-Schema (Albumin, IgG, IgM, IgA)		**Kulturelle Diagnostik / Erregernachweis** [1]
☐	Oligoklonale Banden	☐	Kultureller Nachweis (bakterielle Erreger)
		☐	Kultureller Nachweis (Mykobakterien)
	Infektionsdiagnostik (Antikörper-Indices AI)	☐	Kultureller Nachweis + PCR (Mykobakterien)
	Liquor +Serum		
☐	Masernvirus-AI (IgG)	☐	Herpes-simplex-Virus 1, 2 – PCR
☐	Rötelnvirus-AI (IgG)	☐	Varicella-Zoster-Virus – PCR
☐	Varicella-Zoster-Virus-AI (IgG)	☐	Cytomegalie-Virus – PCR
☐	Herpes-simplex-Virus 1,2-AI (IgG)	☐	Epstein-Barr-Virus – PCR
☐	Cytomegalie-Virus-AI (IgG)	☐	Influenza A/B - PCR
☐	Mumpsvirus-AI (IgG)	☐	Borrelien – PCR
☐	FSME-AI (IgM und IgG)		
☐	Treponema pallidum-AI (IgG)		
☐	Borrelia burgdorferi-AI (IgM und IgG)		

[1] Ein separates Liquor-Röhrchen ist erforderlich, wenn gleichzeitig noch weitere Liquorparameter gewünscht sind.
Transportsystem der Wahl für Liquorproben sind sterile, farblose Polypropylenröhrchen mit Stopfen. Polycarbonat- und Glasröhrchen sind für die Untersuchungen ungeeignet. Es sollte ein rascher Transport ins Labor erfolgen.

Exclusiv gedruckt von Mediaform® ☎ (040) 727 360-0 · Nachdruck verboten. · 06.2008 · 5-08-1213