Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr.


**IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR**
**IMD Berlin MVZ**

IMD Labor Berlin

Nicolaistraße 22, 12247 Berlin (Steglitz)
Tel +49 30 77001-322, Fax -332

akkreditiert durch DAkkS nach DIN EN ISO 15189

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13142-01-00


**Auftragsnummer des Labors**

Hier bitte sorgfältig Barcode-Etikett aufkleben

**!! MUSTER – nicht zur Anforderung verwenden !!**

**Bitte bestellen Sie als Praxis diese Scheine in unserem Labor.**

Nicht für IGEL und Kassenpatienten verwenden!

**Inanspruchnahme einer privatärztlichen Behandlung**

Hiermit beauftrage ich die nachfolgend aufgeführten Laborleistungen im o.g. Facharztlabor. Ich bin damit einverstanden, dass ggf. einzelne Analysen an ein Kooperationslabor weitergeleitet werden. Das Honorar wird auf Grundlage der Gebührenverordnung für Ärzte (GOÄ) vom Facharztlabor oder dem Kooperationslabor berechnet und ist von mir zu zahlen. Eine Erstattungspflicht meiner Privatversicherung besteht nicht. Die Laborkosten verstehen sich zzgl. einer einmaligen Material- und Versandkostenpauschale von 10,67 €.
Die Verarbeitung meiner im Rahmen der Diagnostik anfallenden personenbezogenen und Gesundheitsdaten kann im Falle einer Weiterleitung an ein Kooperationslabor durch dieses erfolgen. Dies geschieht selbstverständlich unter Berücksichtigung der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. Meine Rechte als von der Datenverarbeitung betroffene Person können mir auf Wunsch näher durch Aushändigung eines entsprechenden Informationsblattes erläutert werden.

Gelesen, zur Kenntnis genommen und inhaltlich einverstanden: _____ Unterschrift (ggf. gesetzl. Vertreter)

weitere Anforderungen:

Vertragsarztstempel / Unterschrift überw. Arzt

| Profile I) | |
|---|---|
| ☐ Praxisprofil 1 II) | |
| ☐ Praxisprofil 2 II) | |
| ☐ Praxisprofil 3 II) | |
| ☐ Praxisprofil 4 II) | |
| ☐ Leber | S |
| ☐ Niere | S |
| ☐ Stoffwechsel | S,E,cNaF |
| ☐ Fettstoffwechsel | S |
| ☐ Oberbauch | S |
| ☐ OP-Block | S,E,C,cNaF |
| ☐ Standard klein | S,cNaF |
| ☐ Standard mittel | S,cNaF |
| ☐ Standard groß | S,cNaF |
| ☐ Drogenscreening | U |

| Hämatologie | |
|---|---|
| ☐ Kleines Blutbild | E |
| ☐ Großes Blutbild | E |
| ☐ Retikulozyten | E |
| ☐ BSG | E |
| ☐ zell. Immunstatus III) | E |
| ☐ Blutgruppe IV) | E |

| Gerinnung | |
|---|---|
| ☐ Quick (INR) | C |
| ☐ PTT | C |
| ☐ Fibrinogen | C |
| ☐ D-Dimere | C |
| ☐ Antithrombin (Aktivität) | C |
| ☐ Protein S (fr. Antigen) | C |
| ☐ Protein C (Aktivität) | C |
| ☐ APC-Resistenz | C |
| ☐ Antiphospholipidsyn. V) | S,3xC |

| Harnanalyse | |
|---|---|
| ☐ Urinstatus | U |
| ☐ Urinsediment | U |
| ☐ Albumin | U |
| ☐ Kreatinin-Clearance VI) | S,SU |
| ☐ Katecholamine VII) | SU |
| ☐ 5-HIES | SU |

| Klinische Chemie | |
|---|---|
| ☐ CRP | S |
| ☐ GOT (ASAT) | S |
| ☐ GPT (ALAT) | S |
| ☐ γ-GT | S |
| ☐ AP | S |
| ☐ Bilirubin gesamt | S |
| ☐ Bilirubin direkt | S |
| ☐ Amylase | S |
| ☐ Lipase | S |
| ☐ CK | S |
| ☐ Troponin - I hs | S |
| ☐ NT-pro BNP | S |
| ☐ Cholinesterase | S |
| ☐ Harnsäure | S |
| ☐ Natrium | S |
| ☐ Kalium | S |
| ☐ Calcium | S |
| ☐ Phosphat | S |
| ☐ Gesamteiweiß | S |
| ☐ Elpho+Gesamteiweiß | S |
| ☐ Immunfixation | S |
| ☐ Immunglob. G,M,A | S |
| ☐ IgE | S |
| ☐ Magnesium | S |
| ☐ Zink | S |
| ☐ Selen | S |
| ☐ Kupfer | S |

| Anämie / Vitamine | |
|---|---|
| ☐ Anämiescreening VIII) | S+E |
| ☐ Hb-Elektrophorese | E |
| ☐ Eisen | S |
| ☐ Ferritin IX) | S |
| ☐ Transferrin | S |
| ☐ lösl. Transf.-Rezeptor | S |
| ☐ Retikulozyten-Hb | E |
| ☐ Folsäure | S |
| ☐ Holo-TC (akt. VB12) | S |
| ☐ Vitamin B1 | E |
| ☐ Vitamin B2 | E |
| ☐ Vitamin B6 | E |
| ☐ Vitamin A / E | S |

| Diabetes / Niere | |
|---|---|
| ☐ Glucose | cNaF |
| ☐ Oraler GTT | 2xcNaF |
| ☐ HbA1c | E |
| ☐ HbA1c Hämolysat | Häm |
| ☐ Insulin 3) | S |
| ☐ C-Peptid | S |
| ☐ Proinsulin, intakt | E |
| ☐ Kreatinin | S |
| ☐ Harnstoff | S |
| ☐ Albumin | S |
| ☐ Cystatin C | S |
| ☐ Homa-Index | S,cNaF |

| Rheuma / Autoimmun. | |
|---|---|
| ☐ kl. Rheumablock X) | S |
| ☐ gr. Rheumablock XI) | S |
| ☐ RF-Klasse IgM / IgA | S |
| ☐ CCP-AAk | S |
| ☐ MCV-AAk | S |
| ☐ ANA (IFT mit AC-Code) | S |
| ☐ ANA-Diff. (wenn ANA pos.) | S |
| ☐ ENA-AAk | S |
| ☐ dsDNA-AAk | S |
| ☐ AMA | S |
| ☐ ASMA | S |
| ☐ ANCA | S |
| ☐ Lupus-Antikoag. XII) | 3xC |
| ☐ Cardiolipin Ak | S |
| ☐ β2-Glykoprotein I-AAk | S |
| ☐ Inselzellen-AAk | S |
| ☐ GAD-AAk | S |
| ☐ HLA (diab. Mell. Typ I) 1) | E |
| ☐ Transglutaminase-AAk | S |
| ☐ Endomysium-AAk | S |
| ☐ Gliadin-Ak | S |
| ☐ HLA (Zöliakie) 1) | E |
| ☐ HLA-B27 1) | E |

| Knochenstoffwechsel | |
|---|---|
| ☐ Parathormon | E |
| ☐ 25 (OH) Vitamin D3 | S |
| ☐ 1,25 (OH)2 Vitamin D3 | S |
| ☐ Knochen-AP (Ostase) | S |

| Infektionsdiagnostik | |
|---|---|
| ☐ Procalcitonin | S |
| ☐ Bordetella pertussis-Ak | S |
| ☐ Borrelia burgdorferi-Ak | S |
| ☐ Chlamydia pneumoniae-Ak | S |
| ☐ C. trachomatis 4) | Ages |
| ☐ C. trachomatis | U |
| ☐ CMV-Ak | S |
| ☐ CMV-PCR 2) | E |
| ☐ EBV-Ak | S |
| ☐ N. gonorrhoeae DNA 4) | Ages |
| ☐ N. gonorrhoeae DNA | U |
| ☐ Hepatitis-A-Ak | S |
| ☐ Anti-HBc | S |
| ☐ HBs-Ag | S |
| ☐ Anti-HBs | S |
| ☐ HBV-PCR 2) | E |
| ☐ HCV-Ak | S |
| ☐ HCV-PCR 2) | E |
| ☐ HCV-Genotypisierung | E |
| ☐ Helicobacter-Ak | S |
| ☐ HIV 1/2-Ak / p24-Ag | S |
| ☐ HIV-PCR 2) | E |
| ☐ HSV-Ak | S |
| ☐ HSV-PCR | E |
| ☐ Influenza-A/B-Ak | S |
| ☐ Masern-Virus-Ak | S |
| ☐ Mumps-Virus-Ak | S |
| ☐ Mycoplasma pneum.-Ak | S |
| ☐ Röteln-Ak | S |
| ☐ RSV-Ak | S |
| ☐ Toxoplasmose-Ak | S |
| ☐ TPHA | S |
| ☐ VZV-Ak | S |
| ☐ Yersinia-Ak | S |

| Arteriosklerose | |
|---|---|
| ☐ Risikoprofil XIII) | S,E,sC |
| ☐ Cholesterin | S |
| ☐ HDL-Cholesterin | S |
| ☐ LDL-Cholesterin | S |
| ☐ Triglyceride | S |
| ☐ Lipoprotein (a) | S |
| ☐ Homocystein | sC |

| Respiratorische Multiplex-PCR | |
|---|---|
| ☐ Viral. resp. Multiplex-PCR Panel 1 | A |
| ☐ Viral. resp. Multiplex-PCR Panel 2 | A |
| ☐ Bakt. resp. Multiplex-PCR Panel | A |

| Hormone / Tumormarker | |
|---|---|
| ☐ TSH | S |
| ☐ fT3 | S |
| ☐ fT4 | S |
| ☐ MAK | S |
| ☐ TRAK | S |
| ☐ Calcitonin 3) | S |
| ☐ Thyreoglobulin (hTG) | S |
| ☐ FSH | S |
| ☐ LH | S |
| ☐ Östradiol (E2) | S |
| ☐ Testosteron gesamt | S |
| ☐ SHBG | S |
| ☐ Androgenindex XIV) | S |
| ☐ DHEAS | S |
| ☐ Cortisol | S |
| ☐ Prolaktin | S |
| ☐ IGF1 / IGF-BP 1-6 | S |
| ☐ Androstendion | S |
| ☐ ACTH | E |
| ☐ Aldosteron | S |
| ☐ Renin XV) | E |
| ☐ ß-HCG | S |
| ☐ AFP | S |
| ☐ AFP-L3 | S |
| ☐ DCP | S |
| ☐ CEA | S |
| ☐ CA 19-9 | S |
| ☐ CA 125 | S |
| ☐ CA 15-3 | S |
| ☐ PSA | S |
| ☐ NSE | S |
| ☐ Metanephrine | E |
| ☐ iFOBT (kurativ) | i |

0069 0093 10

IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR · IMD Berlin MVZ · Tel. 030 - 77 00 13 22 · FA1301 V04

Bitte beachten Sie die Rückseite

| Nummer | Untersuchung | Hinweis |
|---|---|---|
| I | Leber | GOT, GPT, gamma-GT, AP, Bilirubin gesamt, Albumin |
| | Niere | Kreatinin, Harnsäure, Harnstoff, Natrium, Kalium, Albumin, eGFR |
| | Stoffwechsel | Glucose, Cholesterin, Triglyceride, Harnsäure, HbA1c |
| | Fettstoffwechsel | Cholesterin, Triglyceride, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin |
| | Oberbauch | GPT, gamma-GT, AP, Bilirubin gesamt, Lipase |
| | OP-Block | Glucose, GPT, Kreatinin, ges. Eiweiß, Kalium, Natrium, Quick (INR), aPTT, TZ, Fibrinogen, kl. Blutbild |
| | Standard klein | Glucose, GPT, gamma-GT, Kreatinin, Harnsäure, Kalium |
| | Standard mittel | Glucose, GPT, gamma-GT, Cholesterin, Triglyceride, Kreatinin, Harnsäure, ges. Eiweiß, Kalium, Natrium |
| | Standard groß | Glucose, GOT, GPT, gamma-GT, AP, Bilirubin gesamt, Kalium, Natrium, Calcium, Cholesterin, Kreatinin, Harnsäure, Harnstoff, Ges. Einweiß, Trigylceride, Ferritin |
| | Drogenscreening | Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cannabinoide, Kokain, Opiate |
| | Viral. resp. Multiplex-PCR Panel 1 | SARS-CoV-2-RNA, Influenza A-Virus, Influenza-B-Virus, Respiratory Syncytial Virus |
| | Viral. resp. Multiplex- PCR Panel 2 | SARS-CoV-2-RNA, Influenza A-Virus, Influenza B-Virus, Respiratory Syncytial Virus, Adenovirus, Humanes Metanpneumovirus, Parainfluenza-Virus, Humanes Rhinovirus |
| | Bakt. resp. Multiplex-PCR Panel | Bordetella pertusis, Bordetella Parapertussis, L. pneumophila-DNA, Streptococcus pneumoniae-DNA, Haemophilus influenzae-DNA, Mycoplasma pneumoniae-DNA, Chl. pneumoniae-DNA |
| II | Materialart entsprechend der Praxisprofile | |
| III | Zellulärer Immunstatus | Basis-Profil: T-, B- und NK-Zellen, CD4+ und CD8+ T-Zellen (inkl. Ratio), naive und memory T-Zellen, aktivierte T-Zellen |
| IV | Blutgruppe | AB0, RH-Faktor, Ak-Suchtest, Nothilfepass (Anforderungsdokument und Probengefäß beschriften mit Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum des Patienten / **nicht beschriftete Proben werden nicht bearbeitet!)** |
| V | Antiphospholipid- Syndrom (APS) | (3 x Citrat-Blut, 1 x Serum) Lupus sensitive PTT, Plasmamischtest, SCT (Bestätigungstest 1), dRV VT (Bestätigungstest 2), ACLA Cardilipine IgG/IgM, ß-2-Glycoprotein-1 IgG/IgM/IgA, Immunglobuline -G, -M, -A |
| VI | Kreatinin-Clearance | Größe und Gewicht des Patienten sowie Sammelmenge des 24 h Urins im Auftragsfeld eintragen |
| VII | Ketocholamine | Adrenalin, Dopamin, Noradrenalin (im angesäuerten 24 Std. Sammelurin) |
| VIII | Anamiescreening | gr. Blutbild, Ferritin, CRP, Ret-Hb, Retikulozyten, lösl. Transferin Rezeptor, HoloTC, Folsäure, Transferrin-Sättigung |
| IX | Ferritin | Zur objektiven Beurteilung des Speichereisens, Ferritin immer mit CPR bestimmen (Ausschluss akute Phase Reaktion) |
| X | kleiner Rheumablock | CRP, RF, ASL |
| XI | großer Rheumablock | CRP, RF, ASL, ANA, Anti-Streptokokken DNase |
| XII | Lupus Antikoagulanz | Lupus sensitive PTT, Plasmamischtest, SCT = Silica clotting time (Bestätigungstest 1), dRV VT = dilute Russel´s Viper Venom Test (Bestätigungstest 2) |
| XIII | Arteriosklerose-Risikoprofil | Cholesterin, Triglyceride, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, CRP, Lipoprotein (a), Homocystein, HbA1c |
| XIV | Androgenindex | Quotient aus Gesamttestosteron / SHBG x 100 (freier Androdenindex in %) |
| XV | Renin | EDTA-Vollblut abseren und EDTA-Plasma tieffrieren |

1) Einwilligungserklärung nach Gen-Diagnostik Gesetz
2) separates Probenröhrchen
3) Vollblut (ohne Zusätze) abseren und kühl lagern
4) Abstrichort auf Probengefäß angeben (nicht auf Barcode)

**Materialarten:**

A = Abstrich (trocken, ohne Medium), Ages = gesondertes Abstrichbesteck, C = Cirat-Blut, cNaF = Citrat Natriumfluorid,
E = EDTA-Blut, H = Heparin, Häm = Hämolysat, S = Serum, sC = saures Citrat, St = Stuhl, SU = Sammelurin, U = Urin
i = Spezialröhrchen, anfordern im Labor