

Genotypische HIV-1-Resistenzbestimmung

Die Untersuchung setzt zur Einstellung der Sequenzier-Reaktion eine Bestimmung der HIV-1-Viruslast mittels NAT voraus.

Material: 10 ml EDTA-Blut (inklusive Viruslastbestimmung)

Unterschrift und Stempel des Auftraggebers

Patientendaten:

Name: _____ Vorname: _____ Geburtsdatum: _____
Geschlecht: _____ CD4-Zellzahl: _____ Viruslast: _____

Gewünschte Resistenzbestimmung:

Protease-Inhibitoren (PI) und NRTI/NNRTI¹ CCR5-Antagonisten (Maraviroc)^{○2}
 Integrase-Inhibitoren (INI)³

Klinische Einstufung des Patienten:

therapienaiv Verdacht auf Therapieversagen compliant non-compliant

Kumulierte Therapiehistorie:

NRTI	NNRTI	PI	INI	Entry-Inhibitoren
<input type="checkbox"/> ABC	<input type="checkbox"/> DOR	<input type="checkbox"/> ATV	<input type="checkbox"/> BIC	<input type="checkbox"/> T-20 (ENV)
<input type="checkbox"/> AZT	<input type="checkbox"/> EFV	<input type="checkbox"/> DRV	<input type="checkbox"/> DTG	<input type="checkbox"/> MVC
<input type="checkbox"/> D4T	<input type="checkbox"/> ETR	<input type="checkbox"/> FPV	<input type="checkbox"/> EVG	
<input type="checkbox"/> DDI	<input type="checkbox"/> NVP	<input type="checkbox"/> IDV	<input type="checkbox"/> RAL	
<input type="checkbox"/> FTC	<input type="checkbox"/> RPV	<input type="checkbox"/> LPV		
<input type="checkbox"/> 3TC	<input type="checkbox"/> DLV	<input type="checkbox"/> NFV		
<input type="checkbox"/> TDF		<input type="checkbox"/> SQV		
<input type="checkbox"/> DDC		<input type="checkbox"/> TPV		
		<input type="checkbox"/> APV/FPV		

NRTI: nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren
NNRTI: nichtnukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren
PI: Protease-Inhibitoren
INI: Integrase-Inhibitoren

Letzte Therapie vor Resistenztestung:

NRTI	NNRTI	PI	INI	Entry-Inhibitoren
<input type="checkbox"/> ABC	<input type="checkbox"/> DOR	<input type="checkbox"/> ATV	<input type="checkbox"/> BIC	<input type="checkbox"/> T-20 (ENV)
<input type="checkbox"/> AZT	<input type="checkbox"/> EFV	<input type="checkbox"/> DRV	<input type="checkbox"/> DTG	<input type="checkbox"/> MVC
<input type="checkbox"/> D4T	<input type="checkbox"/> ETR	<input type="checkbox"/> FPV	<input type="checkbox"/> EVG	
<input type="checkbox"/> DDI	<input type="checkbox"/> NVP	<input type="checkbox"/> IDV	<input type="checkbox"/> RAL	
<input type="checkbox"/> FTC	<input type="checkbox"/> RPV	<input type="checkbox"/> LPV		
<input type="checkbox"/> 3TC		<input type="checkbox"/> NFV		
<input type="checkbox"/> TDF		<input type="checkbox"/> SQV		
		<input type="checkbox"/> TPV		

NRTI: nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren
NNRTI: nichtnukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren
PI: Protease-Inhibitoren
INI: Integrase-Inhibitoren

Stand: 04/2019

○ Fremdleistung

¹ Leistung gemäß Anlage I der Richtlinie des GBA zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung

² Vor Gabe oder bei Verdacht auf Therapieversagen. Höchstens 2x im Krankheitsfall berechnungsfähig.

³ Unter Gabe bei Verdacht auf Therapieversagen. Höchstens 2x im Krankheitsfall berechnungsfähig.