



Tab. I Diagnostik zur ätiologischen Abklärung von Symptomen bei STD (8)

Symptome, > Verdachtsdiagnose, Befund	Äußeres Genitale										Urethritis	Vaginose / Vaginitis	Zervizitis	Adnexitis	PID ²⁾	Proktitis	Prostatitis	Juckreiz	Allgemeine Symptome - z. B. Fieber, LKS	Exanthem	
	Papel	Erythem	Bläschen	Krusten	"Rote Streifen"	"Levide Flecken"	Warzen	Ulcus / Erosion													
N. gonorrhoeae ³⁾								+	+	(+)	+	+	+	+	+						
T. pallidum ³⁾	+							+											+	+	
Mycopl./Ureaplasma									+	(+)			+	+		(+)	+				
Chlamydien (D - K) ³⁾									+		+	+	+	+	(+)						
Chlamydien (L1 - L3)								(+)							(+)				(+)		
Gardnerella vaginalis									(+)	+	(+)										
Kolonisations-Keime ¹⁾	(+)	(+)						+	(+)	+	(+)			(+)							
Trichomonas sp.								(+)	+	+	+								+		
Sprosspilze	(+)	+	(+)					(+)	(+)	+									+		
HIV ³⁾																			+	(+)	
HSV 2 (ev. 1)				+	+			+	(+)	(+)	+										
HPV	+							+	+										(+)		
Virus - Hepatitis - Gruppe																				+	
Krätze - Milben	(+)		(+)	(+)	+														(+)		
(Filz-) Läuse	(+)			(+)		+													(+)		
Empfehlung Untersuchungsmaterial	Serum	+						+	(+ ³⁾		+								(+)	+	+
	Abstrich "weißes T-Medium"	+	+	(+)				+	+	+	(+)		+						+		
	Abstrich "schwarzes T-Medium"	(+ ³⁾		(+)				+	+		+	+	+	+							
	Urin - ohne Zusätze (→ Neisseria Go-NAT, Chlamyd.NAT)									+	+	(+)	+	+					(+)	(+)	
	Abstrich "Gensonde"							+	+		+		+	+							
	Viralkulturette			+	+			+			+										
	Digene DNA - Sampler (HPV)	+						+	+											(+)	

Quelle: mod. n. Friese et.al. (2003); Menzel, Nenoff, Schulz, Schwede (2005)

Legende

- 1) Kolonisationskeime des Genitalbereiches lt. Tabelle III
- 2) PID = Pelvic inflammatory disease
- 3) Immer an Doppelinfektionen denken - d. h. z. B. bei GO - Verdacht auch Chlamydien - Ausschluss sinnvoll bzw. Luesserologie bei HIV-Verdacht, usw.

+ häufig / typisch / wichtig
(+) u. U. / seltener / ergänzend