

فيروس البارفو B19 (الحصبة الألمانية) الإصابة بالعدوى أثناء الحمل

بالنسبة لمن لديهم تأمين قانوني:

لا يمكن لشركات التأمين الصحي تغطية مصروفات بعض الخدمات الطبية أو لا يمكن تغطيتها في كل الحالات (على سبيل المثال الخدمات المقدمة بناءً على طلب المريض نفسه) وبالتالي يجب على المريض دفع ثمنها بنفسه.

يرجى الرجوع إلى نموذج الطلب الخاص بالخدمات الصحية الفردية لمعرفة الأسعار الحالية.

يرجى مراعاة أنه في حالة رصد أجسام مضادة (IgM)، يلزم إجراء المزيد من الفحوصات التشخيصية. ويتم تحديد نطاق هذه الخدمات بمعرفة الطبيب المعالج. وقد تختلف مصروفات ذلك في هذه الحالة.

بالنسبة لمن لديهم تأمين خاص:

تتم تغطية المصروفات من خلال التأمين الصحي الخاص وفقاً للأنحة أجور الأطباء وأطباء الأسنان السارية، إذا لم يكن هناك استثناء مسبق لخدمة معينة. إذا كانت لديك أية أسئلة، يسر طبيبك تقديم المشورة إليك.

IMD
Labor Berlin

IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
IMD Berlin MVZ

Nicolaistraße 22
12247 Berlin (Steglitz)
Tel +49 30 77001-322
Fax +49 30 77001-332
info@imd-berlin.de · IMD-Berlin.de

IMD
Labor Berlin

AR_FL_059_04

Fotos: ©fotolia, ©adobe stock, IMD Berlin

ما وسائل التشخيص المتاحة؟

بعد الإصابة بفيروس البارفو B19، يكتسب الجسم حماية مناعية. ويمكن رصدها عن طريق رصد الأجسام المضادة في المختبر. إذا لم يتم رصد الأجسام المضادة IgG، فلا تكون هناك حماية مناعية. ويشير رصد الأجسام المضادة IgG بالاشتراك مع نتيجة الأجسام المضادة IgM السلبية إلى حدوث إصابة سابقة مع وجود المناعة. وتجدد الإشارة إلى أنه لا يمكن عادة رصد الأجسام المضادة IgM إلا لفترة قصيرة بعد الإصابة. لذلك، فلإجراء تقييم أفضل، يجب إجراء اختبار مناعي لرصد الأجسام المضادة IgG مع فحص نضوج الأجسام المضادة (اختبار الرغبة) بشكل إضافي. إذا تم رصد الأجسام المضادة IgM، فيوصى بإجراء المزيد من الفحوصات بالتشاور مع طبيبك المعالج (اختبار المناعة، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) إذا لزم الأمر). إذا تم تأكيد الاشتباه في حدوث العدوى أثناء الحمل، فيتم إجراء فحوصات دورية منتظمة للجنين عن طريق تقنيات التصوير (مثل الموجات فوق الصوتية).

هل يوجد علاج؟

لا يوجد علاج محدد للبالغين أو الأطفال المصابين. ويتم علاج المرض بحسب الأعراض المحتملة (مثل الراحة في الفراش، وتناول أدوية خفض الحمى، إلخ). إذا كانت هناك علامات على الإصابة بعدوى فيروس البارفو B19 (مثل فقر الدم) لدى الجنين، فيمكن علاج الجنين عن طريق نقل الدم عبر الحبل السري.

DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-MI-13142-01-00

ما فيروس البارفو B19؟

فيروس البارفو B19 هو مسبب المرض الذي تحدث بسببه الحصبة الألمانية. ووفقاً لما توصلت إليه المعارف حالياً، فإنه يصيب البشر فقط. جدير بالذكر أن الفيروس منتشر في جميع أنحاء العالم ويمكنه البقاء على قيد الحياة في البيئة بشكل جيد. ويمكنه أن يعيش في البيئة لعدة أيام إلى أسابيع إذا توفرت الظروف المواتية. تحدث العدوى على مدار السنة، ولكنها تزداد في فصلي الشتاء والربيع.

كيف يمكن أن أصاب بالعدوى؟

ينتقل فيروس البارفو B19 من شخص لآخر عن طريق عدوى الرذاذ. ويحدث ذلك غالباً عن طريق الهواء، بما في ذلك عند التحدث أو السعال أو العطس. بدلاً من ذلك، قد ينتقل الفيروس في صورة عدوى اللطاخة (على



سبيل المثال عن طريق مقابض الأبواب الملوثة) أو، في حالات نادرة، من خلال نقل الدم. إذا حدثت عدوى أثناء الحمل، يكون هناك احتمال لانتقال الفيروس إلى الجنين من ليس لديهم حماية مناعية، أي جميع من لم يصابوا بعد، معرضون لخطر الإصابة بالعدوى. وبحسب العمر، يؤثر ذلك على ما يصل إلى 60 بالمائة من السكان. هناك خطر متزايد للإصابة بالعدوى خاصة بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة أو موظفي المدارس أو موظفي رعاية الأطفال.

ما الأعراض التي تظهر؟

تستمر العدوى بفيروس البارفو B19 إما دون ملاحظتها أو قد تسبب ظهور أعراض مرضية. وتشمل الأعراض المحتملة أعراضاً شبيهة بأعراض الأنفلونزا، مثل الصداع، والحمى، وربما تورم العقدة الليمفاوية، والشعور بالضيق والإسهال. بعد حوالي أسبوع-أسبوعين من الإصابة، قد يتكون طفح جلدي (طفحية)، والذي يبدأ عادة على خدود الوجه ثم ينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم، مثل الكتفين والذراعين واليدين والساقين والقدمين. في بعض الأحيان، قد يحدث ألم المفاصل (ألم مفصلي) في المفاصل الصغيرة لليدين والقدمين. وعادة ما تختفي الأعراض بعد حوالي أسبوع-أسبوعين، ولكن في بعض الحالات الفردية قد تستمر لفترة أطول أو تظهر مجدداً.

العدوى أثناء الحمل

حوالي 30-40 في المائة من النساء في سن الإنجاب غير محصنات ضد فيروس البارفو B19. وإذا أصيبت المرأة بالعدوى أثناء الحمل، فقد ينتقل الفيروس إلى الجنين. ويكون الخطر مرتفعاً بشكل خاص خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل.

حيث يدمر الفيروس الخلايا البدائية لخلايا الدم الحمراء لدى الجنين. ونتيجة لذلك، يحدث فقر دم حاد، مصحوب باحتباس الماء في الأنسجة (موه الجنين). وإذا لم يتم إجراء أي تدخل علاجي في هذه المرحلة، فقد يحدث إجهاض أو ولادة طفل ميت.

كيف يمكنني حماية نفسي وحماية الجنين؟

لا يوجد تطعيم متاح حالياً. ويجب على الحوامل اللواتي لم يصبن بعدوى فيروس البارفو B19 من قبل تجنب مخالطة المصابين (المحتملين) بالحصبة الألمانية أثناء الحمل. إذا مرض طفل في منزلك، فيجب مراعاة تدابير النظافة الصحية والتعقيم بشكل خاص. ويسر طبيبك تقديم المشورة إليك بشأن ذلك.

