

Выявление стрептококков группы В у беременных женщин

стрептококки группы В колонизируют толстую кишку человека и могут попасть оттуда во влагалище.

Поэтому для точного выявления стрептококков группы В необходимо взять мазок для бактериологического посева из влагалища и прямой кишки.

Некоторые экспресс-тесты (иммунологические тесты, которые дают результат сразу после взятия мазка) менее чувствительны, чем методы посева, то есть они иногда не выявляют колонизацию стрептококками группы В.

Хотя обнаружение стрептококков группы В на ранних сроках беременности не считается фактором риска инфицирования новорожденного, колонизация беременной женщины в период перед родами связана со значительно более высоким риском для ребенка.

По этой причине беременные женщины должны обследоваться на 35-37-й неделе беременности (рекомендация Немецкого общества гинекологии и акушерства).

Для застрахованных, имеющих обязательную медицинскую страховку:

Некоторые медицинские услуги не покрываются больничными кассами или могут быть покрыты не во всех случаях (например, по желанию пациента) и поэтому должны оплачиваться самим пациентом.

Актуальные цены указаны в форме заказа на отдельные медицинские услуги.

Для застрахованных, имеющих частную медицинскую страховку:

Частная медицинская страховка покрывает расходы в соответствии с действующим Положением об определении стоимости платных медицинских услуг, если не было предварительного исключения данной услуги. Если у вас есть вопросы по этому поводу, ваш врач с радостью вас проконсультирует.

Стрептококки группы В во время беременности



IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
IMD Berlin MVZ

Nicolaistraße 22
12247 Berlin (Steglitz)
Tel +49 30 77001-322
Fax +49 30 77001-332
info@imd-berlin.de · IMD-Berlin.de



Стрептококки группы В во время беременности

Стрептококки серологической группы В (*Streptococcus agalactiae*) – это бактерии, колонизирующие кишечник и мочеполовую систему женщин.

В Германии они обнаруживаются во влагалище и фекалиях примерно у 10 % беременных женщин.

Они не представляют опасности для будущей матери и обычно не вызывают никаких симптомов. Как правило, они также не представляют опасности для будущего ребенка во время беременности.

Почему полезно проверять наличие стрептококков группы В у беременных?

Стрептококки группы В могут передаваться от беременной женщины ребенку. Передача обычно происходит во время родов, начиная с момента разрыва плодных оболочек.

Каждый второй ребенок В-стрептококк-положительных женщин колонизируется этими бактериями после вагинальных родов. Затем патогенные микроорганизмы можно обнаружить на коже и слизистых оболочках, даже если у ребенка нет никаких признаков заболевания. Однако у 1-2% новорожденных детей, рожденных от

женщин с стрептококком группы В, могут развиться инфекции, вызванные этими бактериями

Инфекции, вызванные стрептококками группы В у новорожденных

Заболевания, проявляющиеся в первые дни жизни, обычно протекают в виде тяжелой общей инфекции, которая может привести к летальному исходу. Также могут возникнуть пневмония и менингит, которые приводят к необратимым последствиям.

Риск передачи инфекции можно значительно снизить, если вводить антибиотик,

эффективный против стрептококков группы В (обычно пенициллин), с начала родов или после разрыва амниотического мешка. Однако это предполагает, что на тот момент известно, является ли у беременная женщина носителем стрептококков группы В

Поэтому рекомендуется проводить тестирование беременных женщин на наличие стрептококков группы В.

Лечение антибиотиками до родов не обязательно, поскольку колонизация обычно не представляет риска для матери и ребенка во время беременности.

