

Hamile kadınlarda B streptokokların saptanması

B streptokoklar insan kolonunda kolonize olur ve buradan vajinaya girebilir. Bu nedenle, B streptokokları güvenilir bir şekilde tespit etmek için vajina ve rektumdan bakteriyolojik kültür için örnek alınmalıdır.

Bazen önerilen hızlı testler (örnek alındıktan hemen sonra sonuç veren immünolojik testler) kültür yöntemlerinden daha az duyarlıdır, yani bazı durumlarda B streptokok kolonizasyonunu tespit edemezler.

Gebeliğin erken döneminde B streptokokların saptanması yenidoğan enfeksiyonu için bir risk faktörü olarak kabul edilmezken, doğumdan önceki dönemde gebe kadının kolonize olması çocuk için önemli ölçüde daha yüksek bir riskle ilişkilidir.

Bu nedenle hamile kadınlar hamileliğin 35 ila 37. haftalarında muayene edilmelidir (Alman Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin [Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V] tavsiyesi).

Yasal sağlık sigortası olanlar için:

Bazı tıbbi hizmetler sağlık sigortaları tarafından karşılanamaz veya her durumda karşılanamaz (örneğin hastanın kendi isteği üzerine) ve bu nedenle hasta tarafından ödenmelidir.

Güncel fiyatlar için lütfen bireysel sağlık hizmetleri sipariş formuna bakın.

Özel sigortası olanlar için:

Özel sağlık sigortası, daha önceden belirlenen bir hizmet muafiyeti yoksa, doktorlar için geçerli ücret tarifesine (GOÄ) göre maliyeti karşılar. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışabilirsiniz.

Hamilelik sırasında B streptokoklar



IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
IMD Berlin MVZ

Nicolaistraße 22
12247 Berlin (Steglitz)
Tel +49 30 77001-322
Fax +49 30 77001-332
info@imd-berlin.de · IMD-Berlin.de

TUER-FL_052_04



Fotos: ©fotolia, ©adobe stock, IMD Berlin



B streptokoklar nedir?

Serolojik B grubu streptokoklar (*Streptococcus agalactiae*) kadınların bağırsak ve ürogenital sistemlerinde kolonize olan bakterilerdir. Almanya'da hamile kadınların yaklaşık %10'unun vajinasında veya dışkısında tespit edilirler.

Anne adayı için tehlike oluşturmazlar ve genellikle herhangi bir belirtiyeye neden olmazlar. Hamilelik sırasında doğmamış çocuk için de genellikle bir risk yoktur.

Hamile kadınların B streptokoklarla kolonize olup olmadığını kontrol etmek neden yararlıdır?

B streptokoklar hamile kadından çocuğa bulaşabilir. Bulaşma genellikle doğumda, zarların yırtılmasından sonra başlar.

B streptokok pozitif kadınların her ikinci çocuğu vajinal doğumdan sonra bu bakterilerle kolonize olur. Patojenler daha sonra çocuklar herhangi bir hastalık belirtisi göstermese bile cilt ve mukoza zarlarında tespit edilebilir. B streptokok pozitif kadınlardan doğan çocukların %1-2'sinde ise bu bakteriler yenidoğanda enfeksiyona neden olmaktadır.

Yenidoğanlarda B streptokok enfeksiyonları

Yaşamın ilk birkaç gününde ortaya çıkan hastalıklar genellikle ölümcül olabilen ağır bir genel enfeksiyon şeklinde seyreder. Pnömoni ve menenjit de ortaya çıkabilir ve kalıcı hasara neden olabilir.

B streptokoklara karşı etkili bir antibiyotik (genellikle penisilin) doğumun başlangıcından itibaren veya amniyotik kese yırtıldıktan sonra uygulanarak bulaşma riski önemli ölçüde azaltılabilir. Ancak bunun için hamile kadının

B streptokoklarla kolonize olup olmadığının o anda bilinmesi gerekir.

Bu nedenle hamile kadınların B streptokok varlığı açısından test edilmesi tavsiye edilir. Kolonizasyon genellikle hamilelik sırasında anne ve çocuk için risk oluşturmadiğundan, doğumdan önce antibiyotik tedavisi gerekli değildir.

