

Sağlık sigortaları 25 yaşına kadar olan kadınlar için yılda bir idrar tarama testi sunmaktadır!

Klamidya enfeksiyonu testi size ne kadar süreyle, ne zaman ve kimden enfeksiyon kapığınızı söyleyemez.

Bu nedenle enfeksiyon, partnerinizin sizi aldattığı anlamına gelmez.

Tedavisi var mıdır?

Zamanında fark edilen bir klamidya enfeksiyonu, yeterli tedavi uygulandığı takdirde herhangi bir hasar oluşmadan iyileşir. Genellikle iyi tolere edilen antibiyotiklerle tedavi edilir. Ancak enfeksiyon tedavi edilmezse veya çok geç tedavi edilirse kısırlık gibi sonuçsal hasarlar ortaya çıkabilir.

Cinsel yolla bulaşan tüm hastalıklarda olduğu gibi, cinsel partnerler de enfekte olabileceğinden onlar da tedavi edilmelidir.

Tedavi sürdüğü süreçte korunmasız cinsel ilişkiden (prezervatif veya oral koruma olmadan) kaçının.



Yasal sağlık sigortası olanlar için:

Bazı tıbbi hizmetler sağlık sigortaları tarafından karşılanamaz veya her durumda karşılanamaz (örneğin hastanın kendi isteği üzerine) ve bu nedenle hasta tarafından ödenmelidir.

Güncel fiyatlar için lütfen bireysel sağlık hizmetleri sipariş formuna bakın.

Özel sigortası olanlar için:

Özel sağlık sigortası, daha önceden belirlenen bir hizmet muafiyeti yoksa, doktorlar için geçerli ücret tarifesine (GOÄ) göre maliyeti karşılar. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışabilirsiniz.



IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
IMD Berlin MVZ

Nicolaistraße 22
12247 Berlin (Steglitz)
Tel +49 30 77001-322
Fax +49 30 77001-332
info@imd-berlin.de · IMD-Berlin.de

TUER-FL_053_02

Fotos: ©fotolia, ©adobe stock, IMD Berlin



Chlamydia enfeksiyonu

Chlamydia trachomatis



Chlamydia trachomatis nedir?



Chlamydia trachomatis, genital bölgede kolonize olan ve insan hücrelerinde çoğalan cinsel yolla bulaşan bir bakteridir. Klamidya enfeksiyonu dünya çapında en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biridir. Kadınlar ve erkekler eşit derecede etkilenebilir.

Almanya'da özellikle cinsel olarak aktif ergenler ve genç yetişkinler etkilenebilmektedir. Genç kadınların yaklaşık %10-20'si enfekte olmaktadır. Ne hastalık ne de patojenin tespiti bildirilebilir olmadığından, enfeksiyon oranı sadece tahmin edilebilir. Buradaki istisna Chlamydia trachomatis serotip L1 ila L3'tür. Bunlar için gelecekte RKI'ye anonim bir bildirim yapılacaktır.

Nasıl enfekte olurum?

Bulaşma, korunmasız cinsel ilişki (vajinal, anal veya oral) sırasında enfekte vücut sıvılarının (idrara, vajinal salgılar, meni, gözyaşı sıvısı) mukozal zarlarıyla teması yoluyla gerçekleşir. Seks oyuncaklarının paylaşılması da bulaşmaya yol açabilir.

Ancak, klamidya tükürükte bulunmadığı için öpüşme yoluyla bulaşma mümkün değildir.

Hangi belirtiler ortaya çıkabilir?

İB birçok vakada klamidya enfeksiyonu belirti vermeden ortaya çıkar ve bu nedenle genellikle uzun süre fark edilmez veya tamamen gözden kaçır. Kadınların yaklaşık %80'inde ve erkeklerin yaklaşık %50'sinde enfeksiyon asemptomatiktir.

Rahatsızlık olursa 1-3 hafta sonra ortaya çıkabilir.

Kadınlar idrar yaparken yanma, kaşıntı ve sarımsı veya pürülan akıntı yaşayabilir. Fallop tüpleri ve yumurtalıklar da sıklıkla etkilenir. Fallop tüplerinin iltihaplanması (adneksit) ateş ve karın ağrısına neden olabilir. Bununla birlikte, karaciğer iltihabı (perihepatit) da bir sonuç olarak ortaya çıkabilir. Tedavi edilmeyen enfeksiyonlar fallop tüplerinde geri dönüşü olmayan yapışıklıklara ve yara izlerine yol açabilir. Ektopik gebelik ve kısırlık olası sonuçlardır.

Hamilelikte özel durumlar

Hamilelik sırasında tespit edilmeyen klamidya enfeksiyonları düşüklerle, erken doğumlara ve prematüre doğumlara yol açabilir. Bir enfeksiyon tespit edilirse, hamilelik sırasında antibiyotik tedavisi de uygulanabilir.

Bu nedenle, klamidya taraması yıllardır doğum öncesi bakımın bir parçası olmuştur.

Patojenin enfekte annelerden yenidoğanlara bulaşması doğum sırasında mümkündür. Çocuklar enfekte olursa, iyileşmesi aylar süren pürülan konjonktivitten muzdarip olurlar. Zatürre de meydana gelebilir.

Erkekler, kadınlara benzer semptomlarla (irinli akıntı, idrar yaparken kaşıntı veya yanma) üretra iltihabından muzdariptir. Üretra ve prostat iltihabı erkeklerde kısırlığa da yol açabilir.

Nadiren konjonktiva iltihabı oluşabilir. Eklemelerde reaktif iltihaplanma (artrit) da klamidya enfeksiyonundan sonra ortaya çıkabilir.

Kendimi nasıl koruyabilirim?

Enfeksiyon riski cinsel partner sayısı ile artar. Prezervatif veya oral korunma mendili kullanımı bu riski önemli ölçüde azaltır. Doğum kontrol hapının cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlamadığını lütfen unutmayın!

Teşhis nasıl yapılır?

Bir enfeksiyonu tespit etmek için tercih edilen yöntem, sabah idrarının ilk kısmından (5 ml) moleküler biyolojik tespittir (PCR) (orta akım idrarı yok). Kadınlarda rahim ağzından smear testi ve erkeklerde üretradan smear testi de mümkündür.

