

Testle ilgili başka nelere dikkat etmem gerekir?

Size klamidy enfeksiyonu teşhisi konulursa, cinsel partnerinizin de tedavi edilmesi gerekir. O da enfekte olabilir. Partneriniz tedavi edilmezse, tedavi bittikten sonra tekrar enfekte olabilirsiniz.

Test size ne kadar süredir enfekte olduğunuzu söyleyemez. Genellikle enfeksiyon belirtisi olmadığından, ne zaman ve kimden enfekte olduğunuzu söylemek zordur. Bu nedenle enfeksiyon partnerinizin sizi aldattığı anlamına gelmez. Sonucu sadece siz ve doktorunuz bileceksiniz. Doktorlar ve muayenehane çalışanları gizlilikle yükümlüdür ve bu nedenle başka kimseye (ebeveynleriniz dâhil) söyleyemezler.

Klamidya testi için ödeme yapmak zorunda mıyım?

Sizde veya cinsel partnerinizde genital bölgede klamidy veya diğer patojenlerle enfeksiyona işaret eden belirtiler varsa, testin masrafları genellikle sağlık sigortası (özel ve yasal) tarafından karşılanır.



Sağlık sigortası şirketleri 25 yaşına kadar olan genç kadınlar için yılda bir idrar tarama testi sunmaktadır!

Yasal sağlık sigortası olanlar için:

Herhangi bir semptomunuz yoksa ve laboratuvar testini kendi isteğinizle yaptırmak istiyorsanız masraflar yasal sağlık sigortası tarafından karşılanmaz ve sizin tarafınızdan ödenmelidir.

Güncel fiyatlar, bireysel sağlık hizmetleri için sipariş formunda bulunabilir.

Özel sigortası olanlar için:

Özel sağlık sigortası, daha önceden belirlenen bir hizmet muafiyeti yoksa, doktorlar için geçerli ücret tarifesine (GOÄ) göre maliyeti karşılar.



IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
IMD Berlin MVZ

Nicolaistraße 22
12247 Berlin (Steglitz)
Tel +49 30 77001-322
Fax +49 30 77001-332
info@imd-berlin.de · IMD-Berlin.de

TUER-FL_054_02

Fotos: ©fotolia, ©adobe stock, IMD Berlin



Chlamydia enfeksiyonu Bu nedir?

Gençler için bilgiler



Öncelikle:

Birinin Klamidya enfeksiyonu olduğu dışarıdan bakılarak anlaşılmaz. Ayrıca temiz olmamakla da ilgisi yoktur!



Klamidya nedir?

Klamidya, cinsel olarak aktif kız ve erkeklerin mahrem bölgelerinde kolonize olabilen ve çoğalabilen bir bakteridir. Klamidya enfeksiyonları dünya çapında en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasındadır.

Nasıl enfekte olurum?

Klamidya enfeksiyonu korunmasız cinsel ilişki yoluyla bulaşır. Cinsel olarak aktif olan herkes enfekte olabilir. Cinsel partnerinizi sık sık değiştirirseniz enfeksiyon riski artar.

Bulaşıcı ajanlar, meni veya vajinal sıvılar gibi enfekte vücut sıvıları yoluyla bulaşır.

Bu arada, klamidya sarılma, yüzme havuzları ya da klozet kapakları yoluyla bulaşmaz. Klamidya tükürükte bulunmadığı için öpüşme yoluyla da bulaşması mümkün değildir.

Hangi belirtiler ortaya çıkabilir?

Bir kız olarak aşağıdaki belirtileri veya değişiklikleri fark ederseniz:

- Vajinadan gelen alışılmadık sarımsı akıntı
- Adetler arasında ara kanama
- Cinsel ilişkiden hemen sonra kanama
- İdrar yaparken veya karnın alt kısmında ağrı

ya da erkek olarak:

- Üretradan beyazımsı akıntı veya
- idrar yaparken yanma hissi

mutlaka doktorunuza gitmeli ve muayene olmalısınız.

Tedavi edilmeyen bir klamidya enfeksiyonu ileride büyük sorunlara yol açabilir. Uzun süren enfeksiyonlar organlara zarar verebilir. Bir kız çocuğu olarak artık doğal yollarla hamile kalamayabilirsiniz.

Bir erkek olarak, testisleriniz artık yeterli sperm üretemeyebileceğinden, daha sonraki doğurganlığınız da sınırlı olabilir.

Bir enfeksiyon zamanında fark edilirse, reçete edildiği şekilde alınırsa antibiyotiklerle iyi bir şekilde tedavi edilebilir. Bu ilaçlar genellikle iyi tolere edilir. Yan etkiler nadiren ortaya çıkar. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen gizlilik içinde doktorunuza başvurun.

Kendimi nasıl koruyabilirim?

Enfeksiyona karşı en iyi koruma, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da koruma sağlayan prezervatif veya oral koruma mendillerinin kullanılmasıdır.

Doğum kontrol hapı sadece hamileliği önler, enfeksiyonlara karşı koruma sağlayamaz!



Hangi teşhisler yapılır?

Klamidya doğrudan idrarda tespit edilebilir. Bunun için sabah kalktıktan hemen sonra ilk idrar akışı gerekir.

Ayrıca kızlarda rahim ağzından, erkeklerde ise üretradan sürüntü alınabilir. Bunu yapmak için jinekoloğunuza veya üroloğunuza gitmeniz gerekir.

Her iki seçenek de güvenilirdir. Laboratuvar sonuçları birkaç gün sonra elinizde olacaktır.

Doktorunuz sizin için en iyisinin ne olduğunu sizinle görüşecektir.

